Azienda Ospedaliera di Gallarate PO Gallarate	**MODULO DI ACCOMPAGNAMENTO PER SCOTCH TEST**			
	Documento n. MOD-LAG-01-15	Rev. 00	Data 24/05/2006	Pag. 1 di 1

SCOTCH TEST

1) La raccolta va eseguita al momento del risveglio mattutino, prima che il paziente defechi e si lavi
2) Utilizzare esclusivamente scotch trasparente (normale scotch da cartoleria)
3) Tagliarne un pezzo della lunghezza del vetrino fornito dal laboratorio, porlo sull'orifizio anale e comprimere bene
4) Staccare lo scotch e applicarlo ben teso sul vetrino
5) Lavare bene le mani (possibilità di infettarsi)
6) Se non fosse possibile portare i campioni di volta in volta, conservare i primi due in frigorifero per non più di 4 giorni, e consegnarli insieme al terzo, raccolto al massimo 4 ore prima.

QUESTIONARIO

- PROFESSIONE ATTUALE E/O PASSATA……..
- PROVENIENZA DEL PAZIENTE: Italia……..
  Altro Paese Europeo……..
  Paese extra Europeo……
- SOGGIORNO ALL'ESTERO : Dove……..
  Quando……
- SINTOMATOLOGIA: ASSENTE….. PRESENTE…..

  Diarrea…… Dolori addominali….. Prurito perianale…..

  Alvo irregolare….. Perdita di peso….. Febbre…..

  Altri sintomi……